

Bijlage 1

Addendum 1:

Beleid heupfracturen bij zeer kwetsbare ouderen niet wonende in een zorginstelling.

De RTA is tevens toepasbaar op de groep patiënten die niet in zorginstelling woonachtig zijn. Echter zal de patiënt zeer waarschijnlijk na de behandeling niet meer (direct) terug kunnen keren naar de woonsituatie. In deze gevallen zal patiënt worden opgenomen en zal er een klinisch MDO en gezamenlijk besluitvormingsgesprek plaats vinden, waarna behandeling wordt ingezet. Vanuit de klinische setting zal dan de meest geschikte nabehandeling locatie worden georganiseerd.

Addendum 2;

Insturen vanuit zorginstelling voor pijnbehandeling zonder MDO.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat de instellingsarts, reeds samen met patiënt en naasten heeft besloten om een patiënt op het vermoeden van een heupfractuur niet meer te opereren, maar aan te bieden voor pijnstilling middels een PENG blokkade. Samen met beeldvorming is het streven om deze behandeling poliklinisch volgens het zgn. one stop shop principe te organiseren. De verwijzend arts kan rechtstreeks verwijzen naar pijnspecialist. Hoe dit zorgpad logistiek is georganiseerd is locatie specifiek.