

U gaat nu bij uzelf FRAGMIN® toedienen

1



- Lees eerst aandachtig de instructies in het Fragmin tromboseboekje!

2



- Neem het injectiespuitje uit de strip.
- Indien geen needle-trap, lees verder bij foto 3.
- Wel needle-trap? Buig het 'needle-trap' veiligheidssysteem zo'n 60°-80° graden

3



- Pak het naald-afdekdopje vast en trek het in één beweging naar boven los.

4



- Als er een druppel aan de naald blijft zitten, schud die er dan af.
- De luchtbel in het spuitje kan geen kwaad, probeer deze NIET te verwijderen; de luchtbel zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt ingespoten.

Optie 1: Buik

5A



- U kunt de vloeistof onder de huid spuiten zoals hier geïllustreerd, in de voor of zijkant van uw buik.
- Pak een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger.
- Breng de naald loodrecht en in-zijn-geheel in de huidplooi.
- Het spuitje vasthouden met duim en middelvinger.

6A



- Door het spuitje tussen duim en middelvinger te houden, kunt u met de wijsvinger de vloeistof langzaam inspuiten.
- Blijf de huidplooi tijdens het inspuiten vasthouden, NIET opzuigen!
- Nadat u de vloeistof hebt ingespoten, kunt u de naald verwijderen en de huidplooi loslaten, NIET nawrijven!



Aangeboden door Pfizer
als service voor gebruikers
van FRAGMIN®



www.fragmin.nl





- Als alternatief kunt u de vloeistof ook onder de huid van het bovenbeen spuiten.
- Pak een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger.
- Breng de naald loodrecht en in-zijn-geheel in de huidplooi.
- Het spuitje vasthouden met duim en middelvinger.



- Door het spuitje tussen duim en middelvinger te houden, kunt u met de wijsvinger de vloeistof langzaam inspuiten.
- Blijf de huidplooi tijdens het inspuiten vasthouden, NIET opzuigen!
- Nadat u de vloeistof hebt ingespoten, kunt u de naald verwijderen en de huidplooi loslaten, NIET nawrijven!



- Indien geen 'needle-trap': foto 8.
- Buig het naaldje na de injectie vast in de 'needle-trap' door de naald tegen een harde stabiele ondergrond te drukken.
- Gebruik NOOIT een vinger of hand om de needle-trap naar de naald te brengen!



- Berg het gebruikte spuitje op in een naaldcontainer.
- Na afloop kunt u de naaldcontainer terugbrengen bij de apotheek.



- Dat is alles!** Hebt u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Let op dat u NIET spuit:

- Op littekenweefsel
- Op plaatsen die ontstoken of pijnlijk zijn
- In verlamde of geopereerde ledematen of ledematen met trombose of oedeem
- Op plaatsen met rode verkleuringen
- In de buurt van grote bloedvaten
- Binnen een cirkel van 4 cm rond de navel
- Binnen een omtrek van 2 cm van de vorige injectieplaats

