



ALBUMINE/CREATININE RATIO



***1 Beïnvloedende factoren:** Contaminatie van de urine (bloed, fluor), urineweginfectie, manifest hartfalen, koorts, onregelde DM, zware lichamelijke inspanning en/of recent doorgemaakt epileptisch insult

eGFR (CKD-EPI)




Houdt rekening met over- en onderschatting van de eGFR



CNS beleid en registratie

	A1 ACR<3	A2 ACR 3-30	A3 ACR>30
G1 eGFR ≥90/ G2 eGFR 60-89	Geen controle <i>Mogelijk A91 of T90.02</i>	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Cardiovasculaire risicoschatting, CNS als additionele risicofactor meewegen* (Lab)controle 1x/jaar <i>K29 + U99.01 of T90.02 + U99.01</i>	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Influenzavaccinatie Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden (Lab)controle 2x/jaar Verwijzing internist-nefroloog <i>K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01</i>
G3a eGFR 45-59	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Cardiovasculaire risicoschatting, CNS als additionele risicofactor meewegen* (Lab)controle 1x/jaar <i>K29 + U99.01 of T90.02 + U99.01</i>	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Influenzavaccinatie Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden (Lab)controle 2x/jaar <i>K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01</i>	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Influenzavaccinatie Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden (Lab)controle 2-4x/jaar Verwijzing internist-nefroloog <i>K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01</i>
G3b eGFR 30-44	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Influenzavaccinatie Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden (Lab)controle 2x/jaar <i>K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01</i>		
G4 eGFR 15-29	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Influenzavaccinatie Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden Overweeg nierfunctie vervangende therapie (Lab)controle 2-4x/jaar, verwijzing internist-nefroloog <i>K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01</i>		
G5 eGFR <15	Leefstijladviezen, medicatiebewaking Influenzavaccinatie Behandeling gericht op maximaal behoud van nierfunctie en behandeling symptomen (Lab)controle ≥4x/jaar, verwijzing internist-nefroloog <i>K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01</i>		

Risicoschatting op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en mortaliteit:

-  Geen CNS
-  Mild verhoogd risico
-  Matig verhoogd risico
-  Ernstig verhoogd risico

- Bij medicamenteuze behandeling RR en albuminurie: voorkeur voor RAS-remmer
- Bij albuminurie, indien HA wenst, ook U98.01 registreren