

# PET/CT-scan met contrast CT



# Inhoud

Wat is een PET/CT-scan? .....	3
Wat is een contrast CT? .....	3
Vorbereidingen .....	4
Belangrijk .....	4
Extra voorbereiding voor patiënten met suikerziekte .....	5
Het onderzoek .....	5
Het maken van de foto's .....	6
Nazorg .....	7
De uitslag .....	7
Bent u verhinderd? .....	7
Vragen .....	8
Contactgegevens .....	8

# PET/CT-scan met contrast CT

Er is met u afgesproken dat u een PET/CT-scan laat maken. Dit onderzoek kan alleen doorgaan als u zich houdt aan een aantal voorbereidingen. Daarom is het belangrijk dat u de aanwijzingen in deze folder nauwkeurig opvolgt. In deze folder maken we onderscheid tussen patiënten met suikerziekte en patiënten zonder suikerziekte. Ook leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan in deze folder staat. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker dit met u.

## Wat is een PET/CT-scan?

In een PET/CT-scan worden PET en CT gecombineerd. Deze twee technieken vullen elkaar aan.

PET is de afkorting van Positron Emissie Tomografie. PET geeft informatie over de stofwisseling van weefsels. Hiervoor wordt een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten die wordt opgenomen door de te onderzoeken weefsels. Deze stof heet: '18-Fluorodeoxyglucose (FDG)'. De radioactieve stof zendt straling uit die door het PET-onderdeel van de camera wordt opgevangen en vertaald wordt in foto's.

CT is de afkorting van Computer Tomografie. CT maakt gebruik van röntgenstraling en geeft informatie over de structuur van weefsels.

## Wat is een contrast CT?

Dit is een CT waarbij jodiumhoudend contrastvloeistof wordt ingespoten via een infuus in de arm. Deze vloeistof kleurt de organen en bloedvaten aan, waardoor deze op de afbeelding beter te onderscheiden zijn van elkaar.

# Vorbereidingen

## Belangrijk

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen in deze folder zorgvuldig opvolgt. Als u niet of onvoldoende voorbereid bent, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Met de scan brengen wij de suikerstofwisseling in het lichaam in beeld. Als er vóór het onderzoek te veel suiker in uw lichaam aanwezig is, wordt de scan onduidelijk. Daarom zijn er voorbereidingen en gelden er speciale aanwijzingen voor mensen met suikerziekte. Heeft u suikerziekte? Leest u dan ook de informatie onder het kopje 'Extra voorbereiding voor patiënten met suikerziekte'.

- U mag vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer eten. Dit geldt ook voor sondevoeding.
- De dag vóór en de dag van het onderzoek mag u zich niet zwaar lichamelijk inspannen.
- Vanaf zes uur voor uw onderzoek mag u alleen water of koffie en thee zonder melk of suiker. Andere dranken zijn niet toegestaan.
- In de twee uren voor uw afspraak moet u één liter water drinken. Dit zijn ongeveer zes glazen.
- U kunt thuis alvast beginnen met drinken en u mag gewoon plassen.
- 24 uur vóór en 24 uur na toediening van het jodiumhoudende contrastvloeistof moet het gebruik van NSAID's gestaakt worden. NSAID's zijn pijnstillers met een ontstekingsremmende werking. De lijst met NSAID's vindt u op de volgende pagina. Overige medicijnen mag u wel innemen met een beetje water.
- Als u een infuus hebt, mag er vanaf minimaal zes uur voorafgaand aan het onderzoek geen glucosebevattende vloeistof toegediend worden.
- Kleed u warm aan. Het is belangrijk dat u het niet koud hebt als u aan het onderzoek begint.
- Draag kleding met zo min mogelijk metalen onderdelen zoals ritssluitingen, metalen knopen en beha's met beugels.
- Draag geen sieraden en doe piercings uit.
- Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit direct melden bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De

radioactieve stof die gebruikt wordt bij het onderzoek, kan nadelige gevolgen hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen.

### *Lijst met NSAID's*

Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec)	Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen)	Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine	Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo)	Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam)	Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin)	Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen)	Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)	

## **Extra voorbereiding voor patiënten met suikerziekte**

Bent u suikerpatiënt, neem dan contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Om de PET/CT-scan te kunnen maken, moet u bloedsuiker op de afspraaktijd lager zijn dan 10 mmol/l. Als u suikerziekte heeft, zijn er extra voorbereidingen nodig.

## **Het onderzoek**

Het totale onderzoek duurt ongeveer twee uur. U meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

U wordt in de wachtkamer opgehaald door een laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde. Hij of zij brengt u naar de onderzoeksruimte. U gaat in een comfortabele stoel zitten die naar uw wensen kan worden ingesteld.

Er wordt een infuusnaald ingebracht in uw arm. Deze blijft gedurende het hele onderzoek zitten. Uw bloedsuikerwaarde wordt gemeten. Als deze goed is, wordt via het infuus de radioactieve stof toegediend. Deze stof moet ongeveer een uur inwerken. Het is belangrijk dat u tijdens

de inwerktijd van de radioactieve stof zo stil mogelijk op het bed blijft liggen en niet praat. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en mag gewoon autorijden. Er zijn geen risico's of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Mogelijk krijgt u via het infuus ook nog één van de volgende medicijnen toegediend:

- Heparine: een antistollingsmiddel dat ervoor zorgt dat uw bloed minder makkelijk samenklontert.
- Een plasmiddel: een medicijn waardoor uw nieren harder gaan werken en u vaker zult moeten plassen.

Welk medicijn u krijgt is afhankelijk van de reden waarom het onderzoek bij u wordt uitgevoerd.

### **Het maken van de foto's**

Als de radioactieve stof is ingewerkt, wordt eerst de PET/CT-scan gemaakt. Het maken van de scan duurt ruim 20 minuten. Tijdens de scan ligt u op de onderzoekstafel. Deze tafel schuift langzaam door de PET/CT-camera.

Na de PET/CT-scan komt de laborant weer bij u om het contrastmiddel aan te sluiten op uw infuusnaald. Vervolgens wordt de CT met contrastmiddel gemaakt. Dit duurt ongeveer vijf minuten. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel krijgen en een vieze smaak in de mond proeven. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

De medewerkers blijven de hele tijd via een intercom met u in contact. Tijdens de scans moet u stil blijven liggen om duidelijke foto's te krijgen.

Nadat gecontroleerd is of de foto's voldoende informatie opleveren, kunt u naar huis.

## **Nazorg**

Wij raden u aan om na het onderzoek de rest van de dag veel te drinken. Hierdoor raakt u zowel de contrastvloeistof als de radioactieve vloeistof weer snel kwijt via de urine.

## **De uitslag**

De beelden van de scan worden digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw arts. Uw arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

## **Bent u verhinderd?**

Een PET/CT-scan is een kostbaar onderzoek. Daarom is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak bent. Alleen dan kan het onderzoek doorgaan. Kunt u de afspraak niet nakomen? Geef dit dan bij voorkeur zo snel mogelijk, maar in ieder geval minimaal twee werkdagen voor het onderzoek, telefonisch aan ons door. Dan kunnen wij de speciaal voor u bestelde radioactieve stof op tijd annuleren.

Soms komt het voor dat radioactieve stof niet aan de eisen voldoet of niet wordt geleverd. We moeten dan op het laatste moment het onderzoek afzeggen, soms zelfs als u al onderweg bent of al in het ziekenhuis aanwezig bent. Hier kunnen wij niets aan doen, hoe vervelend dit ook is.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

## **Contactgegevens**

Catharina Ziekenhuis

040 - 239 91 11

[www.catharinaziekenhuis.nl](http://www.catharinaziekenhuis.nl)


Polikliniek Nucleaire geneeskunde


040 - 239 86 00

Routennummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op

[www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde](http://www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde)











Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:

**[www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief](http://www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief)**

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven  
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven